

Thuốc điều trị chứng rối loạn sử dụng opioid (MOUD)

Thuốc điều trị chứng rối loạn sử dụng opioid (MOUD) là một phương pháp điều trị hiệu quả, đã được chứng minh giúp mọi người hồi phục. Mọi người phục hồi khác nhau - một cách mọi người phục hồi là với MOUD.

MOUD là việc sử dụng các loại thuốc được Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) Hoa Kỳ phê duyệt, thường được kết hợp với các liệu pháp tư vấn và hành vi, để cung cấp phương pháp tiếp cận "toàn diện" nhằm điều trị chứng rối loạn sử dụng opioid (OUD).

Nghiên cứu cho thấy rằng đối với nhiều người, việc kết hợp giữa thuốc và liệu pháp có thể giúp điều trị thành công OUD, duy trì sự phục hồi và ngăn ngừa hoặc giảm nguy cơ quá liều opioid.

Thuốc điều trị	METHADONE	BUPRENORPHINE	NALTREXONE
Cách thức	<ul style="list-style-type: none"> Thuốc liên kết với các thụ thể opioid 	<ul style="list-style-type: none"> Thuốc liên kết với các thụ thể opioid nhưng không hoạt hóa chúng hoàn toàn 	<ul style="list-style-type: none"> Thuốc ngăn chặn việc hoạt hóa các thụ thể opioid
Tác dụng	<ul style="list-style-type: none"> Xua tan các cơn thèm và triệu chứng cai nghiện 	<ul style="list-style-type: none"> Giảm các triệu chứng cai nghiện và cơn thèm 	<ul style="list-style-type: none"> Ngăn chặn tất cả các opioid gây hưng phấn
Cấp phát	<ul style="list-style-type: none"> Tại cơ sở, hàng ngày tại Chương trình điều trị opioid 	<ul style="list-style-type: none"> Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe kê đơn 	<ul style="list-style-type: none"> Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe kê đơn
Năm được FDA phê duyệt	<ul style="list-style-type: none"> 1972 	<ul style="list-style-type: none"> 2002 	<ul style="list-style-type: none"> 2006



Phương pháp điều trị MOUD giúp giảm 76% nguy cơ quá liều sau 3 tháng



Phương pháp điều trị MOUD giúp giảm 59% nguy cơ quá liều sau 12 tháng

Dữ liệu từ drugpolicyfacts.org

